

## Colza

La reprise de végétation est effective, le stade C2 (entre nœuds visibles) est généralement atteint. Les 1ers apports d'azote et le soufre doivent être réalisés à ce jour. Quelques parcelles nécessitent une intervention de rattrapage désherbage sur dicotylédones (matricaires, plantes compagnes comme la lentille toujours présente), attendre des températures supérieures à 15°C pour intervenir.

Peu d'insectes sont présents pour le moment. Les conditions météo sont propices aux vols des charançons de la tige, ceci reste à surveiller.

## Céréales d'hiver

La reprise de végétation est effective pour les céréales d'automne.

Les désherbages d'automne montrent une bonne efficacité globalement. Seules quelques parcelles justifient un rattrapage contre les vulpins et les parcelles non désherbées cet automne. Ils seront à réaliser dès que les conditions météo seront réunies (hygrométrie, amplitude thermique <10°C, température plutôt positive).

Préférez désherber avant d'appliquer le 1er apport d'azote (laisser 2-3 jours entre les deux interventions).

## Autres cultures

Les semis des céréales de printemps (orge et avoine) ainsi que les pois peuvent être réalisés. Il est important d'avoir un sol suffisamment ressuyé pour intervenir dans les parcelles.

« Ouvrir » les terres permet d'avoir un sol homogène, plus facilement ressuyé et facilite le réchauffement de celui-ci.

Les pois d'hiver redémarrent, les désherbages sont à réaliser.

DP

### Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03 24 33 71 26
- Le Pôle Elevage : 03 24 36 64 41

UN CONSEIL  
PHYTOPHARMACEUTIQUE  
NEUTRE ET OBJECTIF !  
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE  
EN CHARGE DE  
L'AGRICULTURE,  
SOUS LE NUMÉRO  
IF01762

TERRES d'AVENIR