

Cultures...

COLZA :

La majorité des parcelles est entrée en floraison, le traitement sclérotinia est à positionner idéalement 10 jours après le début floraison. Ce positionnement est crucial car aucun produit n'a d'efficacité curative.

BLE :

Les stades varient entre fin tallage et 1 nœud selon l'exposition et la date de semis.

L'intérêt et le choix de produit pour la régulation doivent être réfléchis au cas par cas.

ESCOURGEONS :

Les parcelles sont au stade 1 à 2 nœuds. Pour les stratégies deux fongicides, la première intervention doit être positionnée dès que possible. Les variétés sensibles à la rouille naine sont à surveiller de près.

MAÏS :

Certaines parcelles ont déjà été semées.

Un semis précoce expose sa culture plus longtemps aux gelées et aux bio-agresseurs (insectes du sol et corvidés).

Néanmoins il permet lorsque la température du sol est STRICTEMENT supérieure à 8° de prendre de l'avance.

Un programme désherbage intégrant un post semis prélevé type Chloroacetamide permet une gestion plus facile des vivaces par la suite.

GEL :

De manière générale, les cultures sont fortement sensibles du stade germination à la levée.

Les parcelles de betteraves et pois de printemps sont à surveiller.


PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE :

Celui-ci est exigible dès le 15 avril, en cas de besoins nous sommes disponibles pour vous accompagner !

mesparcelles
optimprotect

Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26



AL

TERRES d'AVENIR