

COLZA : début de floraison

La floraison débute ou est bien engagée pour les parcelles les plus précoces. Les premiers pétales sont tombés et suite aux derniers épisodes pluvieux il est temps d'appliquer **vosre fongicide** anti sclerotinia. Une seule application en préventif est généralement suffisante. La double application est à réserver aux parcelles hétérogènes.

Pas d'intervention **insecticide** à prévoir ces jours-ci.

Protégeons nos abeilles et pour rappel il est interdit d'associer triazoles et insecticides de même la réglementation impose des créneaux horaires pour ces traitements.

CEREALES D'HIVER : stade épi 1cm à 2 noeuds

Régulateurs : en cours pour les derniers semis.

Fongicide : à surveiller le risque Rouille Jaune sur variétés sensibles en blé et le risque rynchosporiose sur les orges d'hiver.

La septoriose se cantonne actuellement en bas de plantes et le risque est faible d'après les outils de pilotage.

Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

ORGE DE PRINTEMPS : stade 2-3 feuilles à début tallage

Pour les parcelles les plus avancées, le désherbage peut s'envisager dès maintenant.

Pour rappel à partir du stade 3 feuilles, une intervention mécanique peut être réalisée par l'intermédiaire d'une herse étrille ou d'une houe rotative en veillant à en adapter la vitesse.

BETTERAVES : stade cotylédons

A réaliser le premier passage en désherbage.

MAÏS :

Semis en cours

PPF :

N'oubliez pas de remplir votre Plan Prévisionnel de fumure

BVL

