

Gérer la complémentation azotée au pâturage

Nous savons que le fourrage le moins cher est l'herbe pâturée. De plus, l'herbe jeune, riche en azote soluble s'adapte parfaitement à la complémentation du maïs et permet de réelles économies en correcteur azoté. Il faut donc chercher sa valorisation maximale sur vos exploitations.

Optimiser le pâturage



La hauteur d'entrée dans le paddock doit être de 8 cm à l'herbomètre, hauteur à la cheville pour la botte.

Pour favoriser le pâturage, il est important de rationner l'ensilage de maïs. En période de pleine pousse, il est préférable de distribuer la ration à l'auge le soir pour favoriser le pâturage la journée.

Valoriser les excédents d'herbe

L'ensilage d'herbe est à développer pour bien gérer le pâturage, en récoltant les excédents de printemps et apporter des protéines en hiver. Des dates de récoltes précoces doivent être recherchées pour de meilleures valeurs alimentaires. La conservation doit être soignée pour préserver la qualité des protéines.

Optimiser le coût alimentaire

La complémentation azotée est à adapter en fonction de vos objectifs de production et du taux d'urée, sur une base de 5% de tourteau de soja (ou 7% de tourteau de colza) par kg brut de maïs ensilage distribué.

L'économie peut également se faire sur le concentré de production. Dans des conditions d'herbe pâturée à volonté et de qualité, son efficacité est faible, au mieux : 0,8L de lait/kg de concentré.

PRODUCTION (kg de lait)	SEUILS D'ALERTE DU TAUX D'UREE (mg/l)
20	Moins de 150 ou plus de 250
25	Moins de 160 ou plus de 260
30	Moins de 170 ou plus de 270
35	Moins de 190 ou plus de 290
40	Moins de 210 ou plus de 310

RITZ Noémie

TERRES d'AVENIR



ARDENNES
CONSEIL ÉLEVAGE

Pour plus de renseignements,
les techniciens d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition au 03 24 57 08 61

