

BLE TENDRE : Stade floraison à début épiaison.

La **rouille jaune** est la maladie dominante cette année. Les autres maladies sont quasiment absentes. La protection fongicide doit permettre le contrôle de la rouille jaune surtout sur des variétés sensibles comme Campésino, Némio. Elle est à surveiller jusque la fin du remplissage des grains.

Quelques **puçerons** sont observés pour le moment. La période de nuisibilité s'étend jusqu'au stade grain laiteux et le seuil de nuisibilité est atteint lorsque qu'un épi sur 2 est colonisé.

Pour le moment la pression reste très faible. De plus, la faune auxiliaire est présente et très active (larve de coccinelle).

BETTERAVES : Stade 10 feuilles

La couverture de sol est atteinte dans la majorité des terres rouges ce qui n'est pas forcément le cas dans les terres blanche où la croissance est toujours limitée. Les **puçerons noirs et verts** restent à surveiller.

A réaliser les apports de **bore** dans les parcelles développées.

Binage en cours

Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

POIS DE PRINTEMPS : Floraison

Les premières gousses sont en formation. La végétation est globalement saine. Appliquez un **fongicide contre la rouille** en préventif par sécurité ou au maximum dès l'apparition des premières pustules.


Tordeuses : Surveiller le cumul des captures (BSV – Flash techniques ...)

MAIS : Levée à 6-8 feuilles

Des **dés herbages** sont toujours en cours. Pour rappel, évitez tout traitement avec des hormones (Banvel 4S, Hurler, Kart) entre les stades 6 et 8 feuilles pour limiter les phénomènes de phytotoxicité. Maintenez une vigilance contre les vivaces (chardons et laitrons). Attendez jusqu'au stade 8 feuilles pour réintervenir contre les liserons notamment avec Banvel 4S (et maxi 0.2).

Des difficultés de levées sont observées par le manque d'humidité.

(DP)



TERRES d'AVENIR

