La brève technique

Les conditions ensoleillées et la remontée des températures sont favorables à la reprise de végétation. Un bilan de l'enherbement des cultures est nécessaire. Dans la majorité des cas, l'efficacité des désherbages d'automne est très satisfaisante. Seules, quelques situations ne le sont pas, un rattrapage herbicide devra être réalisé dès que possible (en bonne condition d'application, adventices sensibles aux herbicides de printemps), tout comme les quelques parcelles qui n'ont pas été désherbées cet automne.

Privilégiez les applications herbicides avant les passages d'engrais. Dans le cas du passage des herbicides en premier, laissez un délai de 2-3 jours avec l'application de l'engrais. Dans le cas contraire, si vous appliquez le passage d'engrais en premier, un délai de 5-6 jours est nécessaire pour appliquer les herbicides.

Les semis des cultures de printemps (céréales et protéagineux) sont à réaliser dès les bonnes conditions de ressuyage des sols.

LE SOUFRE : Y PENSER ABSOLUMENT

Des risques de carence en soufre de plus en plus fréquents.

Le soufre est un élément majeur comme l'azote, et à ce titre un apport de soufre est indispensable sur colza mais aussi sur céréales d'hiver. Sur luzerne le soufre a également un impact.

Le soufre oxydé sous forme sulfate, la seule qui soit assimilable facilement, est très lessivable, à l'instar des nitrates. Plus qu'un manque, c'est le plus souvent un décalage entre les besoins des cultures et les fournitures par le sol qui provoque les carences.

Les cultures de printemps à besoins précoces (orges) sont également exposées à ce manque. Sur betterave un apport avec l'engrais de fond est souhaitable, en maïs un apport en foliaire est nécessaire en cas de symptômes.

Couvrir les besoins pour la reprise de végétation.

Les doses conseillées vont donc varier selon le type de sol, la pluviométrie hivernale, les apports sur le précédent.

Les apports conseillés classiquement sont les suivants :

- Blé et escourgeon : 30 à 40 kg de SO3
- Colza : 60 à 80 Kg de SO3
- Luzerne : 60 à 80 kg de SO3

L'apport doit être réalisé lorsque la reprise de la végétation est engagée : décollement de l'épi pour les céréales, élongation de la tige pour le colza. Un apport avec le premier passage d'azote est possible sans risque de lessivage. Au 2ème passage si la végétation est très avancée il est parfois un peu tard, surtout s'il fait sec après l'apport.

DP

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

TERRES d'AVENIR