



#HERBE&FOURRAGES


CLIMATOLOGIE

	Températures cumulées 2022 (en °C depuis le 1/02)	Pluie cumulée 2022 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)	Altitude (en m)
BUZANCY	881	200	12,4	180
LAUNOIS SUR VENCE	843	241	0,2	195
LINAY	809	253	3,6	175
RENWEZ	830	228	9,4	270
SAULCES CHAMPENOISES	899	154	0,4	149



Repère au pâturage par rapport à la température :

Les critères ci-dessous sont des bonnes pratiques de références :

- Récolte très précoce 700 °C
- Récolte enrubannage 800 à 1 200 °C selon votre besoin en surface pâturable, au détriment de vos futurs stocks fourragers.




SUIVI DE LA POUSSE



Pour le pâturage, les niveaux de pousse sont encore élevés, mais des contrastes apparaissent entre les zones arrosées par les orages de la semaine dernière et d'autres qui n'ont pas reçu d'eau.

Photo prise à Roche 08130 (chez Sarah)

SUIVI DE LA HAUTEUR (en cm herbomètre)



Couverture des besoins par la pousse

Stratégie

Voir bulletin semaine dernière

<https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/elevage/observatoire-de-lherbe/>

Point technique du moment

Pour économiser du plastique vous êtes peut-être en train de réaliser les coupes initialement prévues en enrubannées ou en ensilage tardif par du foin précoce.

Attention, les foins très précoces ont tendance à retravailler voire à chauffer, il ne faut pas hésiter à laisser une journée de plus de séchage supplémentaire si la météo vous le permet. Déserrer la tension des balles, sonder votre fourrage une fois rentré, et ne pas l'empiler de suite (si vous n'avez pas de sonde à fourrage, une simple barre métallique dans le cœur est déjà une bonne indication). **Mettez de côtés les bordures ombragées !**

Si votre fourrage contient beaucoup de légumineuses, il faudra éviter de faner et andainer aux heures les plus chaudes de la journée, envisagez plutôt de travailler en début de matinée.

Dans les zones sèches, une attention particulière doit être portée à la hauteur de sortie : à ce moment de l'année, un surpâturage serait désastreux sur la reprise en cas de faible pluviométrie. Veillez donc à sortir les animaux dès que la hauteur d'herbe n'est plus que de 5 cm.

Dans vos prairies paturées, en cas de présence de refus, profitez que la faucheuse soit de sortie pour les mettre au sol, ils deviendront appétents d'ici 48 heures. Maintenez une hauteur de fauche à 8/10 cm pour limiter l'incorporation de bouse. Dans l'idéal, fauchez vos refus en plusieurs fois afin que votre troupeau suive le rythme.

Pour parler de vos prairies, voir du matériel rare en action, boire un verre ou manger un bout, notez la date ! (cliquez sur l'image pour en savoir plus)



Contact : Antoine LETINOIS
 Référent groupe Herbe&Fourrages Ardennes
 03 24 56 56 26 – 06 23 38 07 33
a.letinois@ardennes.chambagri.fr

