


Mercredi 12 Avril 2023
n°5

#HERBE&FOURRAGES


CLIMATOLOGIE



	Températures cumulées 2023 (en °C depuis le 01/01)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	577	292	18
Linay	581	250	21
Montcheutin	621	176	17
Rocroi	487	386	28
Saulces-Champenoises	629	157	17



SUIVI DE LA POUSSE



Entre les températures douces et les pluies fournies, la pousse est définitivement lancée. Certaines temporaires sont déjà avancées, avec de belles hauteurs d'herbe. Les apports d'azote en fin d'hiver ont été valorisés. La hauteur d'herbe est un indicateur parmi d'autres, et permet non seulement de mesurer la tendance de pousse, mais aussi de la traduire en quantité de matière sèche poussée lorsqu'elle est multipliée à la densité (225 kg/cm) :

$$KgMS/j = \frac{\text{pousse en cm (écart entre deux mesures hebdomadaires)} \times \text{densité}}{\text{durée entre deux mesures}}$$

En moyenne sur le département, la pousse de cette semaine a produit un équivalent de près de 65 kgMS/jour avec de fortes disparités entre parcelles (de 6 à 127 kgMS) et d'une semaine à l'autre (impact météo). Avec un besoin de référence de 15,7 kgMS/UGB, cet indicateur permet d'ajuster le chargement et la complémentation à l'herbe disponible sur pied.

POINT DE SITUATION

Certaines parcelles sont encore gorgées d'eau mais peuvent déjà fournir des volumes d'herbe conséquents. Selon les zones, le pâturage a pu commencer (ou reprendre). Évaluez la portance au cas par cas. Pour les parcelles en déprimage, ne tardez pas à sortir les animaux si ce n'est pas déjà fait, sous peine de pénaliser le rendement.



QUIZ

Quelle est cette plante prairiale indicatrice des sols humides et riches en azote ? On observe sa jolie floraison blanche et rose actuellement.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Si l'herbe est au rendez-vous la portance n'est pas optimale selon les zones. La valorisation de cette herbe est un compromis entre :

- Les besoins alimentaires en cas de stocks limités ;
- La quantité d'herbe et le stade déjà avancé par endroit, à ne pas gaspiller ;
- La portance encore limitante.

Pour les parcelles où la portance reste limitante mais où le stock sur pied augmente trop, il convient :

- Pour les VL, de limiter le temps d'accès à 2 ou 3h par jour et de changer de parcelles tous les 2 jours au maximum ;
- Pour les jeunes bêtes ou les VA, de maintenir un chargement faible si les animaux sont déjà sortis, afin de ne pas dégrader la prairie en attendant qu'elle sèche.

Dans les temporaires, surveillez le stade des graminées, si les conditions météo sont réunies les premières fauches pourront être réalisées dans les jours qui viennent. Observez régulièrement la montée des épis, comme on le ferait pour un blé.

EVENEMENTS A VENIR

Formation « Prairies et haies : quelles plantes bénéfiques pour mes animaux ? » avec l'intervention de Coralie AMAR, Vétérinaire membre du GIE Zone Verte, le 18 avril à Villers-Semeuse, **ENCORE DES PLACES DISPONIBLES**



Contact : Adèle RAYNAUD

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr

