


# # HERBE & FOURRAGES

## CLIMATOLOGIE

	Températures cumulées 2024 (en °C depuis le 01/02)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	391	298	33
Linay	403	234	26
Montcheutin	406	185	18
Rocroi	334	369	39
Saulces-Champenoises	408	164	19




Des températures douces et une luminosité croissante ont été de mise cette semaine. Attention toutefois au rafraîchissement prévu en fin de semaine, qui devrait ralentir le développement des plantes.

## SUIVI DE LA POUSSE

Certaines prairies temporaires présentent déjà de beaux volumes d'herbe, là où les prairies permanentes sont pour le moment moins fournies. Globalement la dynamique de pousse reste encore timide, limitée par des températures matinales relativement fraîches, et une humidité encore excédentaire.

A cette période, chaque centimètre d'herbe > 5cm équivaut à 225 kg MS/ha  
Exemple : pâture à 7 cm = (7-5) x 225 = 450 kg MS/ha disponibles

Hauteurs d'herbe (en cm) par site



## POINT DE SITUATION



La somme de température correspondant au bon stade de développement des plantes pour la mise à l'herbe des animaux (soit 300-350° jour base 01/02) a été dépassée.

Malheureusement pour le moment c'est la très grande fraîcheur des parcelles dans la plupart des secteurs qui est limitante.

On voit déjà des trèfles en proportions relativement importantes par endroit, très certainement du fait des températures globalement douces depuis plusieurs semaines.

## CONSEILS DE LA SEMAINE

Dans les parcelles humides où les apports d'azote n'ont pas encore pu être réalisés, la décision d'intervenir ou non se prend au cas par cas en fonction :

- Du type de matière apporté
- Du matériel et donc du poids du chargement amené à rouler dans la parcelle
- De la portance de la parcelle.

La dynamique de pousse étant encore timide, n'hésitez pas à patienter pour réaliser vos apports. Ils seront valorisés en pleine pousse. De plus, il est préférable de décaler la date d'apport plutôt que d'intervenir coûte que coûte et de risque de dégrader durablement la parcelle (rouages visibles, tassement du sol, chemins et entrée de parcelle détériorés...).

Au pâturage, la sortie des animaux est à adapter aux conditions. Si le vent et les journées ensoleillées permettent un ressuyage en surface assez rapide, les sols restent globalement gorgés d'eau et la portance se détériore dès la première averse.

Limitez les temps de présence et le chargement si vous souhaitez faire pâturer précocément.

## EVENEMENTS A VENIR

- Tour de pâture « Valoriser l'herbe de printemps en conditions humides » le 27/03/2024 à 10h à Margut



**Contact : Adèle RAYNAUD**

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

[adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr](mailto:adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr)

