


CLIMATOLOGIE

| | Températures cumulées 2024 (en °C depuis le 01/02) | Pluie cumulée 2023 (en mm) | Pluie sur 10 jours (en mm) |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Charleville | 512 | 332 | 27 |
| Linay | 537 | 273 | 30 |
| Montcheutin | 538 | 229 | 31 |
| Rocroi | 452 | 409 | 32 |
| Saulces-Champenoises | 544 | 201 | 32 |




Les 500° jour ont été dépassés dans la plupart des secteurs. Cette somme de température correspond à peu près au stade épi 5 cm dans les parcelles à la flore plutôt précoce (dans des prairies à la flore très tardive, ce stade peut être retardé de plusieurs semaines). Les précipitations se poursuivent à un rythme conséquent : 30 mm sur tous les secteurs cette semaine.

SUIVI DE LA POUSSE

Malgré l'humidité, la pousse est désormais bien enclenchée, y compris dans des prairies permanentes peu fertilisées. Les prairies temporaires ayant eu des apports d'azote ou de matière organique répondent bien et seront bonnes à faucher dans le courant du mois d'avril. En espérant qu'une fenêtre météo assez longue se présente pour permettre le ressuyage puis la fauche dans de bonnes conditions.

A cette période, chaque centimètre d'herbe > 5cm équivaut à 225 kg MS/ha
Exemple : pâture à 7 cm = (7-5) x 225 = 450 kg MS/ha disponibles

Hauteurs d'herbe (en cm) par site



POINT DE SITUATION



Les premiers tours de pâturages ont parfois beaucoup marqué le sol. Sur des parcelles à la végétation dense et avec une bonne vie du sol, le couvert ne devrait pas être trop pénalisé. Attention en revanche dans les pâtures où la couverture du sol est déjà insuffisante par endroit et où les plantes peinent à démarrer leur croissance. Un piétinement en condition humide pourrait être plus préjudiciable.

Quiz - Réponse

Je suis le Prunellier aussi connu sous le nom d'Épine noire. A ne pas confondre avec l'Épine Blanche qui fleurit plus tardivement (mai) et est en fait de l'Aubépine.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Les 500° degré jour étant atteints, il est théoriquement temps de finir le déprimage des parcelles de fauche pour éviter de pénaliser le rendement.

En pratique, rares sont les parcelles de fauche ayant réellement pu être déprimées faute de portance suffisante. Dans les parcelles pâturées, un pâturage précoce a parfois pu être réalisé, mais encore une fois les averses ont limité cette possibilité.

Si vous aviez sorti des animaux mais avez été contraints à les rentrer en raison des intempéries, évaluez la portance de chaque parcelle au cas par cas avant de ressortir les animaux. Selon l'orientation des parcelles, le vent et quelques heures de beau temps permettent parfois un ressuyage suffisant.

Pour les animaux restés dehors, ou les VL ayant continué à pâturer, limitez le temps de présence à quelques heures en attendant le retour du soleil.

Attention, les dégâts sur la structure du sol sont un premier élément pour juger de la portance, mais le « salissement » du couvert par de la terre lors du passage des vaches est aussi problématique. Des végétaux souillés seront moins bien consommés lors des prochains tours de pâturage et pourraient créer des zones de refus.

EVENEMENTS A VENIR

- Tour de pâture sur demande



Contact : Adèle RAYNAUD

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr

