


HERBE & FOURRAGES

CLIMATOLOGIE

	Températures cumulées 2024 (en °C depuis le 01/02)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	512	368	43
Linay	634	303	40
Montcheutin	639	265	52
Rocroi	517	457	54
Saulces-Champenoises	643	230	45




Les grosses averses de cette semaine, bien qu'entrecoupées de beau temps ont à nouveau détrempé les parcelles qui commençaient à sécher. Malgré le vent, les sols sont gorgés d'eau et n'arrivent plus à absorber ne seraient ce que quelques millimètres supplémentaires. La fin de semaine devrait donner un peu de répit et permettre un premier ressuyage.

SUIVI DE LA POUSSE

La hausse des températures et la présence – ponctuelle – du soleil favorisent la pousse de l'herbe dans les zones bien exposées. Certaines **prairies temporaires** fertilisées atteignent déjà des hauteurs d'herbe bonnes à faucher (>15 cm à l'herbomètre) avec une croissance de **plus de 130 kgMS/ha/jour**. Sur l'ensemble **prairies permanentes** suivies on atteint une croissance moyenne de **59 kgMS/ha/jour**. A savoir que les croissances d'herbe sont très hétérogènes d'une parcelle à l'autre selon : la fertilisation, l'exposition au soleil, l'exposition au vent, le type de flore (espèces et variétés plus ou moins précoces), l'état de la végétation en fin d'automne et donc en sortie d'hiver.

Hauteurs d'herbe (en cm) par site



POINT DE SITUATION



Encore beaucoup d'humidité au sol et pourtant des graminées qui avancent en stade : les vulpins sont épiés et certaines graminées précoces commencent à épier dans les zones les plus favorables.

Le saviez-vous ?

Des truies gestantes au pâturage peuvent consommer jusqu'à 8 kg bruts d'herbe par jour.

CONSEILS DE LA SEMAINE

La patience est de mise en ce printemps pluvieux.

Peu d'animaux sont sortis. Certains troupeaux laitiers ont pu profiter de quelques journées favorables mais sont pour la plupart de retour en bâtiment ces derniers jours. Ne négligez pas cette période de transition alimentaire.

Pour les jeunes bêtes qui seraient déjà sorties, vérifiez l'état des parcelles régulièrement. En cas de piétinement trop important, l'idéal serait de déplacer les animaux si le parcellaire le permet.

Pour les parcelles les moins avancées n'ayant pas pu recevoir d'apport d'azote faute de portance, il est encore possible d'apporter 20 à 30 unités si les conditions météo des prochaines jours le permettent. Pour les parcelles les plus avancées qui pourront être fauchées précocement, un apport après les premières coupes pourra être réalisé.

Pour les parcelles qui n'auraient pas encore été semées (y compris en prairies), la plupart des sols sont encore trop frais et un semis réalisé dans de mauvaises conditions serait non seulement préjudiciable du point de vue de l'implantation du couvert, mais risquerait en plus de dégrader les sols durablement.

EVENEMENTS A VENIR

- Tour de pâture sur demande



Contact : Adèle RAYNAUD

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr

